

POUR CÉRÉALES

Granulé

Aliment complémentaire de fourrages et de céréales pour chevaux adultes de loisirs, d'instruction ou à l'entretien. Convient aussi pour l'élevage.

Disponible en vrac



Énergie maîtrisée



Correcteur de céréales



Immunité renforcée



Confort digestif



Croissance harmonieuse

CARACTÉRISTIQUES**

VALEURS ANALYTIQUES MOYENNES

Protéines brutes	19 %
Matières grasses brutes	2,4 %
Amidon	10 %
Cellulose brute	14,9 %
Cendres brutes	11 %
UFC	70 UF/100 kg
MADC	150 g/kg
Magnésium	0,43 %
Sodium	0,43 %
Calcium	24 g/kg
Phosphore	7 g/kg

ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG

Oméga 3	1,7 g
Oméga 6	10 g

ACIDES AMINÉS / KG

Lysine	8 100 mg
Méthionine + cystine	6 900 mg
Thréonine	7 400 mg

OLIGO-ÉLÉMENTS / KG

3b405 Sulfate de cuivre (II) pentahydraté	78 mg
3b413 Chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté	13 mg
3b103 Sulfate de fer (II) monohydraté	260 mg
3b502 Oxyde de manganèse (II)	114 mg
3b603 Oxyde de zinc	247 mg
3b607 Chélate de zinc et de glycine hydraté	26 mg
3b801 Sélénite de sodium	0,78 mg
3b811 Levure séléninée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivé	0,39 mg
3b201 Iodure de potassium	1,17 mg

VITAMINES / KG

3a672a Vitamine A	26 000 UI
3a671 Vitamine D3	4 160 UI
3a700i Vitamine E	169 UI

LIANTS - ANTIAGGLOMÉRANTS / KG

E562 Sépiolite	12 060 mg
----------------	-----------

SUBSTANCES AROMATIQUES

fiche produit



COMPOSITION**

Son de Blé, Tourteau feed d'extraction de Colza, Luzerne déshydratée agglomérée, Paille de blé, Pois, Drèches et solubles de distillerie de céréales, Tourteau feed d'extraction de Tournesol, Carbonate de Calcium, Tourteau feed d'extraction de Tournesol décortiqué, Drèches séchées et solubles de distillerie de maïs, Mélasse de canne à sucre, Tourteau feed d'extraction de soja, Triticale, Chlorure de Sodium, Blé, Oxyde de magnésie, Bicarbonate de Sodium.

Service client CASALYS
La Noëlle 44150 ANCENIS
02 40 98 92 58
www.casalys-nutrition.fr



CONSOMMATION PAR CHEVAL

Distribuer cet aliment en 2 ou 3 repas.

Quantités recommandées pour un cheval adulte de 500 kg

Activité / Stades physiologiques		Quantité journalière d'aliment ¹	Quantité journalière de céréales ¹
		KG	KG
Cheval au repos		0,5 - 1	1 - 1,5
Sports équestres	Activité normale	0,5 - 1	1 - 3
	Activité modérée	1 - 2	2 - 4
	Activité intense	2 - 3	3 - 5
Poulinières	Gestation	1,5	1,5 - 3
	Début de lactation	2	2 - 3
	Fin lactation/ sevrage	1	1 - 2
Poulain	Jusqu'au sevrage	100 à 200 g / mois d'âge	
	6 à 18 mois	1 - 1,5	1 - 1,5
	18 mois et plus	2	2 - 3

LES RÈGLES À RESPECTER

La consommation journalière d'eau varie de 15 à 60 litres en moyenne pour un cheval de 500 kg.

L'eau doit être saine, disponible et accessible, et les animaux doivent pouvoir boire à volonté.

Distribuer les fourrages au moins 1h avant les concentrés.

Distribuer les rations en minimum 2 repas par jour.

Attendre au moins 1h après un repas pour faire travailler le cheval.

Transition de ration progressive sur 10 jours (mise à l'herbe...).

Version 2025, ce document a été rédigé à titre indicatif et les valeurs contenues sont indicatives. Pour plus d'informations contactez votre conseiller technique.

*Aliments et formules de base sans source de palme.

**La composition de l'aliment et les caractéristiques indiquées sont non contractuelles et présentées à titre indicatif. Elle peuvent être amenées à évoluer afin de respecter le cahier des charges nutritionnel de l'aliment. Consultez l'étiquette du produit pour la liste exhaustive des ingrédients.

Pour calculer le volume à distribuer, la densité de l'aliment est d'environ 0,650 kg pour 1 litre.

¹Les quantités à distribuer doivent être ajustées en fonction de l'activité, le poids et l'état corporel du cheval. Le fourrage doit être la base de la ration. Un programme alimentaire bien adapté au cheval permet de maximiser son potentiel, cependant le calcul d'une ration est complexe. Il est recommandé de contacter votre conseiller technique ou votre vétérinaire.



Service client CASALYS
La Noëlle 44150 ANCENIS
02 40 98 92 58
www.casalys-nutrition.fr

