PROLIFIBRE

Aliment complémentaire de fourrages, en bouchon, pour chevaux et poneys adultes ayant une activité régulière et soutenue.











ATOUTS PRODUIT







Confort digestif



Immunité



Protection renforcée musculaire

COMPOSITION***

Luzerne déshydratée agglomérée, Son de blé, Pulpe de Betterave sucrière séchée. Graines de lin extrudées. Marc de pommes séché, Paille de blé, Mélasse de canne à sucre, Triticale. Son de bé extrudé. Chlorure de sodium. Bicarbonate de sodium, Farine de maïs, Oxyde de magnésium, Sulfate de sodium, Carbonate de Calcium, Levures

CONDITIONNEMENTS





Sac

Big bag

CARACTÉRISTIQUES

VALEURS ANALYTIQUES MOYENNES Protéines brutes 12 Matières grasses brutes 2 Amidon 13 Cellulose brute 16 Cendres brutes 0,76 UF/10 MADC 0 Magnésium 0 Sodium 0 Calcium 0 Phosphore 0	1,6 % 3,6 % 5,5 % . 8 %)0 kg 85 g),4 % 75 %
ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG Oméga 3 Oméga 6	17 g 10 g
ACIDES AMINÉS / KG Lysine 8000 Méthionine + Cystine 4240 Thréonine 4700) mg
OLIGO-ÉLÉMENTS / KG 3b405 Sulfate de cuivre (II) pentahydraté	5 mg 0
VITAMINES / KG 3a672a Vitamine A 10 00 3a671 Vitamine D3 1 20 3a700 Vitamine E 25)0 UI
AMÉLIORATEUR DE DIGESTIBILITÉ / KG 4a1711 Saccharomyces cerevisiae-CNCMI-1077	UFC
LIANTS - ANTIAGGLOMÉRANTS / KG E558 Bentonite-Montmorillonite	5 mg 0 mg
SUBSTANCES AROMATIQUES	

BALANCE CATIONS/ANIONS

BACA 218 meq



CONSOMMATION PAR CHEVAL

Quantités recommandées pour un cheval adulte de 500kg

Activité / Stades physiologiques		Quantité journalière KG
Cheval au repos		1 - 3
Sports équestres	Activité normale	2 - 4
	Activité modérée	3 - 5
	Activité intense	3 - 6

Pour calculer le volume à distribuer, la densité de l'aliment est d'environ 0,650kg pour 1 litre.

Les quantités à distribuer doivent être ajustées en fonction de l'activité, le poids et l'état corporel du cheval. Un programme alimentaire bien adapté au cheval permet de maximiser son potentiel, cependant le calcul d'une ration est complexe. Il est recommandé de contacter votre conseiller technique ou votre vétérinaire.

LES RÈGLES À RESPECTER

La consommation journalière d'eau varie de 15 à 60 litres en moyenne pour un cheval de 500 kg.

L'eau doit être saine, disponible et accessible, et les animaux doivent pouvoir boire à volonté.

Distribuer les fourrages au moins 1h avant les concentrés.

Distribuer les rations en minimum 2 repas par jour.

Attendre au moins 1h après un repas pour faire travailler le cheval.

Transition de ration progressive sur 10 jours (mise à l'herbe...).

^{***} La composition de l'aliment indiqué est non contractuelle et présent à titre indicatif. Elle est sujet d'évoluer fin de respecter le cahier de charge nutritionnel de l'aliment. Merci de veillez à consulter l'étiquette du produit pour la liste des ingrédients. Ce document a été rédigé à titre informatif et les valeurs confenues sont indicatives





^{*} Usine certifiée Socle technique Commun Nourri Sans OGM <0,9%

^{**} Aliments et formules de base sans source de palme